

Làm Thử nghiệm TEE

Getting Your TEE Test

Siêu Âm Tim Qua thực Quản (Transesophageal Echo)

Siêu Âm Tim Qua Thực Quản là gì?

Thử nghiệm TEE giúp bác sĩ xem tim của quý vị vận động như thế nào.

Chúng tôi sẽ làm gì trong khi thử nghiệm:

- Chúng tôi xịt thuốc gây tê vào cổ họng để quý vị được thoải mái hơn.
- Chúng tôi cho thuốc để giúp quý vị thư giãn.
- Chúng tôi thực hiện bằng một đầu dò đặc biệt hoặc ống thăm dò trong ống dẫn thức ăn (thực quản). Ống vào ngay phía sau tim của quý vị. Điều này giúp bác sĩ chụp rõ hình tim của quý vị. Đồng thời cho thấy hình tim của quý vị mà chúng ta không thể nhìn thấy với các xét nghiệm khác như Siêu âm.



Làm Gì Trước Khi Thử Nghiệm

- ✗ Không ăn hoặc uống trong vòng 6 tiếng trước khi thử nghiệm.
- ☐ Nếu quý vị có bệnh tiểu đường và chích insulin, chỉ chích phân nửa liều thuốc. Nếu quý vị đang dùng thuốc viên, hãy uống trọn viên. Quý vị có thể ăn bánh mì nướng và chỉ uống 1 tách nước cam không quá 6 giờ trước khi thử nghiệm. Xin vui lòng gọi cho bác sĩ nếu quý vị có câu hỏi.
- ☐ Nếu quý vị uống thuốc mỗi ngày, quý vị có thể uống thuốc với một ngụm nước. Bác sĩ có thể yêu cầu quý vị không uống một số thuốc nhất định nào đó trước khi làm thử nghiệm này.
- ☐ Nhờ người chở quý vị đến để thử nghiệm. Chúng tôi sẽ cho thuốc để giúp quý vị thư giãn. Vì vậy, quý vị sẽ cần ai đó đưa về nhà. Nếu không có người đưa quý vị về nhà, chúng tôi sẽ không thể làm thử nghiệm.

Trong Ngày Quý Vị Thử Nghiệm

- **Xin vui lòng đến sớm 30 phút!** Hãy đến với Trung tâm Chẩn đoán trên tầng 2 của bệnh viện.
- Hãy nói với bác sĩ nếu quý vị bị khó nuốt. Cho bác sĩ biết nếu quý vị có bất kỳ vấn đề về cổ họng (thực quản) hoặc dạ dày.
- Hãy nói với bác sĩ nếu quý vị có thai.
- Nếu quý vị cần phải hủy hẹn thử nghiệm, xin gọi 272-2403.

Hãy đến sớm 30 phút!

Trang tiếp theo

- Quý vị có thể cần phải trả tiền phụ phí cho thử nghiệm này.

Sau Khi Xét Nghiệm :

- Cổ họng quý vị sẽ bị tê. Sau 1 tiếng, thử uống một chút nước.
- Nếu quý vị bị ho khi nuốt, **đừng** cố gắng ăn. Quý vị có thể ăn khi nuốt mà không bị ho.
- Quý vị có thể bị đau cổ họng sau khi thử nghiệm. Quý vị có thể sử dụng viên kẹo ngậm/lozenges 1 giờ sau khi thử nghiệm.
- Không lái xe hoặc sử dụng thiết bị nặng trong 24 giờ sau khi thử nghiệm.

Câu hỏi? Gọi Chúng Tôi!

Trạm Tim
Trung Tâm Chẩn Đoán, Tầng 2 - Tòa Nhà Hướng Nam
Điện Thoại: 505-272-2403 7 giờ sáng – 5 giờ chiều
Sau 4 giờ chiều gọi 272-2111. Xin gặp “Bác sĩ Tim Mạch” đang trực.

**Trong trường hợp
cấp cứu, gọi 911**

Heart Station\Preps\ Dobutamine Stress Echo-Prep.doc

